

大腸内視鏡検査前処置用下剤

# マグコロール<sup>®</sup>P

## 自宅服用のおすすめ

### ● 作り方・飲み方が簡単

〔 水を入れて簡単に調整できます  
通常1時間で全量(1800mL)服用していただきます 〕

### ● 受容性が良い

(スポーツドリンク様の味で飲み易くなっています)

### ● 良好な洗浄効果

(気泡が少なく内視鏡観察に適した洗浄効果が得られます)



パウチ包装

※使用上の注意等の詳細は、添付文書をご参照ください。

### 下剤(マグコロールP)の溶かし方・飲み方

水を入れるときは容器の底を十分に広げてください。



①キャップを開け、500の目盛りまで水を入れてください。



②キャップを閉め、よく振って粉末を十分に溶かしてください。



③1800の目盛りまで水を追加してください。



④全量を1時間くらいでゆっくり飲んでください。






堀井薬品工業株式会社

TEL: (06) 6942-3481 (代) FAX: (06) 6942-1505

E-mail: kikaku@horii-pharm.co.jp

# 自宅服用の準備表（例）

時間	ご	準備	チェック
検査前日 ( )	食事	検査食（エニマクリン e コロン）を召し上がりください。	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○夕食以降、検査まで絶食になります。</li> <li>○水分は十分に摂ってください。</li> </ul>	
午後 9 時		下剤（センノシド錠）2 錠をコップ 1 杯（200mL）程度の水で飲んでください。	
検査当日 ( )	<b>朝食・昼食は食べないでください。</b>		
	午前__時		ピコスルファート Na 液 1 本をコップ 1 杯（200mL）程度の水に溶かし、はきけ止め（蠕動促進剤）2 錠と一緒に飲んでください。
	午前__時 服用開始		<p>マグコロール P に水を入れて溶かして飲んでください。</p> <p>※7～8分毎に、コップ 1 杯（200mL）程度ずつゆっくり 1 時間ほどかけて、全量 1800mL を飲んでください。</p> <p>※特にご高齢の方は、2 時間以上でもかまわないので、時間をかけてゆっくり飲んでください。</p> <p>※服用後には、<u>水分（500mL 以上）を十分にとってください。</u></p>

## 【洗淨効果UPのポイント】

はきけ止め（蠕動促進剤）によりピコスルファート Na 液とマグコロール P が大腸へスムーズに移行し、相乗的に洗淨効果がよくなる。



QRコードを読み取り、最終の排便が何番であったか受付時にお知らせください。

